

Statistik zum Schwangerschaftsabbruch im Jahr 2019

in der Praxis
Dr. med. Choon-Kang Walther
Fachärztin FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe

Erstellt durch
Med. pract. Samuel Eckstein

1. Einleitung

Frau Dr. Walther praktiziert den medikamentösen und chirurgischen Schwangerschaftsabbruch in der Praxis. Sie führt eine seit über einem Jahrzehnt geführte anonyme Auswertung der erfolgten Schwangerschaftsabbrüche von ihrem Vorgänger weiter.

2. Material und Methoden

Alle Konfliktschwangerschaftskonsultationen der Praxis werden fortlaufend anonymisiert in einer Excel-Tabelle erfasst. Ende jeden Jahres werden diese statistisch ausgewertet. So wurden bis Ende Dezember für das Jahr 2019 gesamthaft 229 Fälle anonymisiert erfasst. Diese anonymen Falldaten wurden durch med. pract. Samuel Eckstein mit Excel und dem Statistikprogramm R ausgewertet.

3. Resultate

Die genauen Auswertungen sind tabellarisch dargestellt. Gesamthaft fanden 229 Konsultationen mit Wunsch nach Schwangerschaftsabbruch statt. Effektiv wurden in der Praxis 202 Abbrüche durchgeführt; 61 chirurgisch und 141 medikamentös. 91% der Patientinnen waren wohnhaft in der Schweiz. Ungefähr zur Hälfte waren sie schweizerischer (53%) respektive nicht-schweizerischer (47%) Herkunft. Die grössten ausländischen Herkunfts-Gruppen waren Patientinnen aus Deutschland (11%), Südamerika (5%) und den Ländern Rumänien, Ungarn, Polen, Slowakei, Russland und Ukraine (8%). Die Patientinnen waren im Durchschnitt knapp 30-jährig (29.89 Jahre). Die unter 20-Jährigen machten 9.4% aus. 85.1% der medikamentösen und 39.3% der chirurgischen Abbrüche konnten am ersten Tag der Konsultation begonnen werden. Die Nachcurettage-Rate bei dem medikamentösen Abbruch betrug 0% bei keiner Nachcurettage auf 141 Fälle. Bei den chirurgischen Abbrüchen kam es ebenfalls zu keiner Nachcurettage.

Schwangerschaftsabbrüche 01.01.-31.12.2019								
Praxis Dr. med. Choon-Kang Walther								
Fachärztin FMH Gynäkologie und Geburtshilfe								
Erstkonsultationen		229		229		100%		
Keine Schwangerschaft				3		1%		
Mole, spontan/misssed abortion, EUG				5		2%		
Anderswo operiert				1		0.5%		
Haben sich anders entschieden				11		5%		
Abbruch durch Ärztin abgelehnt				4		2%		
Effektiv durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche				202		88%		
Differenz zwischen Konsultationen und effektiven Abbrüchen				27		12%		
Schwangerschaftsabbrüche				202		100%		
chirurgisch				61		30%		
medikamentös				141		70%		
Wohnsitz	CH		Ausland		ZH		Ausserkanton (CH)	
	184		18		134		50	
	91%		9%		66%		34%	
Herkunft	CH	Ausland	D	ExJugo	Südamerika	Hun/Rou/PI/R us/Svk	Srilanka	
	108	94	22	4	10	16	6	
	53%	47%	11%	2%	5%	8%	3%	
Vorgeschichte bei		261 Frauen		Mittel	Max	Min		
Alter der Schwangeren (Jahre)				29.89	46	14		
Tage Amenorrhoe bei Behandlungsbeginn				47.47	102	28		
Wievielte Schwangerschaft				2.20	7	1		
Geburten vorher				0.56	4	0		
Abruptio vorher				0.24	4	0		
Medikamentöse Abruptio vorher				0.23	2	0		
Chirurgisch:		61						
Tage Amenorrhoe bei OP				63.95	102	42		
Wartetage bis OP				2.51	14	0		
OP am Tag der Erstkonsultation				24		39.3%		
Medikamentös:		141						
Tage Amenorrhoe bei Mifegyn				40.34	67	28		
Mifegyn am Tag der ersten Konsultation				120		85.1%		
Nachcurettagen				0		0.0%		