

Statistik zum Schwangerschaftsabbruch im Jahr 2020

in der Praxis
Dr. med. Choon-Kang Walther
Fachärztin FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe

Erstellt durch
Dr. med. Choon-Kang Walther

1. Einleitung

Frau Dr. Walther praktiziert den medikamentösen und chirurgischen Schwangerschaftsabbruch in der Praxis. Sie führt eine seit über einem Jahrzehnt geführte anonyme Auswertung der erfolgten Schwangerschaftsabbrüche von ihrem Vorgänger weiter.

2. Material und Methoden

Alle Konfliktschwangerschaftskonsultationen der Praxis werden fortlaufend anonymisiert in einer Excel-Tabelle erfasst. Ende jeden Jahres werden diese statistisch ausgewertet. So wurden bis Ende Dezember für das Jahr 2020 gesamthaft 302 Fälle anonymisiert erfasst. Diese anonymen Falldaten wurden durch Dr. med. Choon-Kang Walther mit Excel ausgewertet.

3. Resultate

Die genauen Auswertungen sind tabellarisch dargestellt. Gesamthaft fanden 302 Konsultationen mit Wunsch nach Schwangerschaftsabbruch statt. Effektiv wurden in der Praxis 271 Abbrüche durchgeführt; 68 chirurgisch und 203 medikamentös. 93% der Patientinnen waren wohnhaft in der Schweiz. Ungefähr zur Hälfte waren sie schweizerischer (48%) respektive nicht-schweizerischer (52%) Herkunft. Die grössten ausländischen Herkunfts-Gruppen waren Patientinnen aus Deutschland (11%), den Ländern Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Polen, Russland, Weissrussland und Ukraine (6%), dem Balkan (7%) und Lateinamerika (5%). Die Patientinnen waren im Durchschnitt 30-jährig (30.31 Jahre). Die unter 20-Jährigen machten 7.0% aus. 84.2% der medikamentösen und 41.2% der chirurgischen Abbrüche konnten am ersten Tag der Konsultation begonnen werden. Die Nachcurettage-Rate bei den medikamentösen Abbrüchen betrug 0.5% bei einer Nachcurettage auf 203 Fälle. Bei den chirurgischen Abbrüchen kam es zu keiner Nachcurettage.

Schwangerschaftsabbrüche 01.01.-31.12.2020								
Praxis Dr. med. Choon-Kang Walther								
Fachärztin FMH Gynäkologie und Geburtshilfe								
Erstkonsultationen		302		302		100.0%		
Keine Schwangerschaft				5		1.7%		
Mole, spontan/misses abortion, EUG				8		2.6%		
Anderswo operiert				7		2.3%		
Haben sich anders entschieden				8		2.6%		
Abbruch durch Ärztin abgelehnt				3		1.0%		
Effektiv durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche				271		89.7%		
Differenz zwischen Konsultationen und effektiven Abbrüchen				31		10.3%		
Schwangerschaftsabbrüche				271		100.0%		
chirurgisch				68		25.1%		
medikamentös				203		74.9%		
Wohnsitz	CH		Ausland		ZH		Ausserkantonale (CH)	
	251		20		189		62	
	93%		7%		75%		25%	
Herkunft	CH	Ausland	DE	Balkan	Latein-amerika	BG, RO, HU, PL, RU, BY, UA	Afrika	
	131	140	31	15	14	18	8	
	48%	52%	11%	6%	5%	7%	3%	
Vorgeschichte bei		271 Frauen		Mittel	Max	Min		
Alter der Schwangeren (Jahre)				30.31	44	14		
Tage Amenorrhoe bei Behandlungsbeginn				46.94	98	21		
Wievielte Schwangerschaft				2.04	8	1		
Geburten vorher				0.56	4	0		
Abruptio vorher				0.31	4	0		
Medikamentöse Abruptio vorher				0.20	3	0		
Chirurgisch:		68						
Tage Amenorrhoe bei OP				62.94	98	31		
Wartetage bis OP				2.36	16	0		
OP am Tag der Erstkonsultation				28		41.2%		
Medikamentös:		203						
Tage Amenorrhoe bei Mifegyn				41.56	76	21		
Mifegyn am Tag der ersten Konsultation				171		84.2%		
Nachcurettagen				1		0.5%		